CORONADO

- PRODUCTOS VETERINARIOS -



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Línea veterinaria · Fichas técnicas

cibeles QUIMTIA Cavajani

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

BLOQUE FOSFÓRICO

Los Bloques Fosfóricos de Cibeles son una herramienta práctica y económica para suplementar minerales en ganado de carne, de leche, ovinos y caprinos.

Principales características

- Contiene fosfato monocálcico, con mayor índice de asimilación que las fórmulas comunes a base de fosfato bicálcico.
- El fósforo se vehiculiza con melaza y el bloque contiene un mínimo de sal, por lo que esta no limita el consumo de minerales. Muy bien consumido en zonas del Chaco con deficiencia de fósforo.
- Amplio rango de minerales que promueven el crecimiento y la reproducción.
- Bloque compactado (no prensado): muy palatable y resistente al clima. No requiere bateas y se coloca directamente en el campo. Envase biodegradable.

Indicaciones

- Indicado siempre que los animales estén ganando peso; para una correcta asimilación del fósforo deben contar con buenas pasturas.
- Imprescindible al momento del entore en vacas en lactancia: los minerales que se pierden por la leche deben reponerse por boca para lograr la preñez.
- En tambos, se recomienda colocarlo en el patio de espera y así ahorrar minerales en la ración.
- En zonas deficientes (región Oriental y Misiones) maximiza el crecimiento de las categorías jóvenes durante la época lluviosa.

Composición

- Relación Ca:P 2:1, ideal para animales en pastoreo.
- Altos niveles de cobre y zinc para zonas deficientes en estos elementos.



Presentación: 25 kg

	%		ppm
Calcio	**12**	Mn	**600**
Fósforo	**6**	Zn	**600**
Magnesio	**1,5**	Co	**2**
NaCl	**20**	I	**15**
		Se	**3**
		Cu	**150**
		Fe	**750**

BLOQUE PROTEICO

Aporta proteínas, minerales y vitamina A. Diseñado para vacunos y lanares en pasturas o rastrojos de baja calidad y pobre digestibilidad.

Principales características

- La melaza como ingrediente base aumenta la palatabilidad y asegura buenas ingestas.
- Además de urea, contiene proteína natural de origen vegetal. No contiene proteína de origen animal.
- Fabricado con alta tecnología: homogéneo y muy resistente a la intemperie. Viene listo para usar y no requiere bateas.

Modo de uso

- Colocar el bloque directamente en el suelo, en un lugar duro, alto y seco: 1 bloque cada 15 vacunos o 30 ovinos, bien distanciados para que todos consuman.
- Reponer aproximadamente cada 10 días según el consumo, y mantener el bloque durante todo el período de suplementación.

Indicaciones

- Estimula la actividad de los microorganismos del rumen y mejora el aprovechamiento de la energía de la pastura.
- En invierno, en cría, recría o preinvernada, asegura al menos el mantenimiento de la condición corporal.
- Las vacas de cría llegan en mejor estado al parto y retoman antes su ciclo reproductivo.
- No recomendado en equinos.

Precauciones

- Contiene urea: suministrar siguiendo estrictamente las instrucciones y solo cuando los animales dispongan de alimento suficiente. En caso de intoxicación, administrar vinagre diluido en agua (50:50): ½ L a terneros y ovejas y 2 a 4 L a bovinos adultos.



Presentación: 25 kg

	%		ppm
Proteína	**28**	Mn	**100**
Humedad	**16**	Zn	**100**
Fósforo	**1**	Co	**0,3**
Calcio	**4**	I	**1,25**
NaCl	**20**	Se	**0,25**
		Cu	**25**
		Fe	**208**
		Vit. A (UI/kg)	**12.750**

Consumo estimado

· Vacas de cría: 200–250 g/día
· Vacas en lactancia: 250–300 g/día
· Ovinos: 60–100 g/día
· Ovejas en lactancia: 100–150 g/día

BLOQUE ENERGÉTICO

Suplemento energético-proteico listo para usar, para animales en crecimiento o en producción sobre pasturas tiernas y verdeos "aguachentos".

Principales características

- Contiene 15 % de proteína, la mitad de origen vegetal (proteína by-pass).
- Aporta un rango completo de minerales y oligoelementos en proporciones correctas.
- Su contenido de lasalocid sódico mejora la utilización de la energía de la pastura y la eficiencia de pastoreo entre un 10 y un 15 %.

Modo de uso

- Colocar directamente en el suelo, en un lugar duro, alto y seco: 1 bloque cada 10 vacunos o 30 ovinos. Regular el consumo con 2 reposiciones semanales.

Indicaciones

- Corrige el desbalance proteico, energético y mineral de las pasturas con alto contenido de agua, que impide buenas ganancias de peso.
- Aumenta la producción en vacas lecheras que pastorean verdeos de baja energía.
- En ovinos, durante el último tercio de gestación, previene la toxemia de preñez y favorece el nacimiento de corderos fuertes.
- Las pasturas deben tener buena disponibilidad: el bloque se consume como suplemento, no como alimento.



Presentación: 25 kg

	%		ppm
Proteína	**15**	Mn	**100**
Humedad	**16**	Zn	**100**
Fósforo	**0,5**	Co	**0,3**
Calcio	**2**	I	**1,25**
NaCl	**10**	Se	**0,25**
		Cu	**30**
		Fe	**150**
		Lasalocid Na	**200**
		EM (MJ/kg)	**8,8**

Consumo estimado

· Ovejas, último tercio de gestación: 150–200 g/día
· Ovejas con corderos: 200–250 g/día
· Corderos: 50–150 g/día
· Vacunos en engorde o lactancia: 500–1.500 g/día

SB500

Concentrado proteico para rumiantes, formulado para mezclar con los granos producidos en el establecimiento y mejorar la relación energía/proteína y minerales de la mezcla.

Características nutricionales

- Aporta nitrógeno bajo dos formas: proteína verdadera de origen vegetal (aminoácidos) y urea soluble, que junto con la energía de fermentación de los granos genera biomasa microbiana.
- La urea viene disuelta en melaza: mezcla homogénea, menor riesgo de intoxicación y mejor aprovechamiento por los microorganismos del rumen.
- Contiene monensina, que mejora la eficiencia de conversión y reduce la acidosis, y reguladores del pH ruminal e intestinal que previenen la caída de los consumos y problemas podales.
- Contiene vitamina A. Muy importante en dietas de confinamiento o semiconfinamiento.

Modo de uso con maíz

- Ideal para confinamiento con grano entero. Con un 10 % de SB500 se necesita una mínima participación de fibra (fardo, silaje, bagazo o cáscara de arroz).
- Si la fibra supera el 10 % de la ración, quebrar el grano. Realizar siempre un acostumbramiento de al menos 14 días.

Dosis

- 90 % de grano seco (maíz o sorgo) + 10 % de SB500. Con grano húmedo, la proporción debe ser del 8 %.



Presentación: 25 kg

	%		ppm
Proteína	**49**	Mn	**166,7**
Humedad	**16**	Zn	**250**
Fósforo	**0,5**	Co	**3,3**
Calcio	**4**	I	**3,3**
NaCl	**5**	Se	**2,3**
Urea (máx.)	**15**	Cu	**83,3**
PC deriv. de NNP	**70**	Fe	**250**
		Vit. A (UI/kg)	**46.000**
		Monensina	**300**

ANTIPARASITARIOS POUR-ON

SUPERMETRINA POUR-ON

Principio activo: Ethion 15 % + Cipermetrina 5 %
Uso: Control de la mosca de los cuernos y de piojos masticadores y chupadores.
Especies: Bovinos.
Dosis:
- 5 mL cada 200 kg de peso vivo (dosis máxima: 10 mL).

Vía de aplicación: Pour-on: derrame dorsal en dos bandas, desde la cruz hasta la base de la cola.
Tiempo de espera: Carne: 15 días · Leche: 0 días.
Presentación: 250 mL · 1 L · 5 L



ECO TOP POUR-ON

Principio activo: Eprinomectina 0,5 %
Uso: Endectocida y garrapaticida: nematodes gastrointestinales y pulmonares, sarna, garrapata, mosca de los cuernos y piojos.
Especies: Bovinos.
Dosis:
- 1 mL cada 10 kg de peso vivo.
- En campañas de erradicación, aplicar cada 21 días.

Vía de aplicación: Pour-on: dos líneas paralelas a 10 cm de la columna, desde la cruz hasta la base de la cola.
Tiempo de espera: Carne: 0 días · Leche: 0 días.
Presentación: 1 L



FIPROTOP POUR-ON

Principio activo: Fipronil 1 %
Uso: Garrapaticida e insecticida: garrapata, mosca de los cuernos y berne.
Especies: Bovinos.
Dosis:
- 1 mL cada 10 kg de peso vivo.
- En planes de erradicación de garrapata, tratar cada 35 días.

Vía de aplicación: Pour-on: dos líneas paralelas a 10 cm de la columna, desde la cruz hasta la base de la cola.
Tiempo de espera: Carne: 200 días · Leche: no usar en vacas lecheras ni en vaquillonas hasta 3 meses antes del parto.
Presentación: 1 L · 5 L



FIPROTOP PLUS

Principio activo: Fipronil 1 % + Fluazurón 2,5 %

Uso: Garrapata (incluso resistente a otros activos), mosca de los cuernos y berne. Volteo rápido y prolongado poder residual.

Especies: Bovinos.

Dosis:

- 1 mL cada 10 kg de peso vivo.

Vía de aplicación: Pour-on: dos líneas paralelas a 10 cm de la columna, desde la cruz hasta la base de la cola.

Tiempo de espera: Carne: 200 días · Leche: no usar en lactancia ni en los 3 meses previos al parto.

Presentación: 1 L · 5 L



ZURONTOP POUR-ON

Principio activo: Fluazurón 2,5 %

Uso: Garrapaticida sistémico: corta el ciclo de la garrapata impidiendo su desarrollo. No produce volteo.

Especies: Bovinos.

Dosis:

- 1 mL cada 10 kg de peso vivo.
- En planes de erradicación, aplicar cada 35 días.

Vía de aplicación: Pour-on sobre la línea dorsal. Aplicar con los animales secos.

Tiempo de espera: Carne: 42 días · Leche: no usar en vacas lecheras en lactación.

Presentación: 1 L · 5 L



ANTIPARASITARIOS TÓPICOS

SUPERMETRINA BAÑO

Principio activo: Cipermetrina 10 % + Ethion 40 %
Uso: Garrapata, sarna, mosca de los cuernos, Dermatobia y mosca doméstica.
Especies: Bovinos.
Dosis:
- Inmersión: pie de baño 1 L cada 1.000 L de agua · reposición 1,5 L cada 1.000 L · refuerzo en seco 0,5 L cada 1.000 L.
- Aspersión: 1 mL por litro de agua, 5 L por animal.

Vía de aplicación: Baño de inmersión o aspersión.
Tiempo de espera: Carne: 15 días · Leche: 2 días.
Presentación: 200 mL · 1 L



SUPERTRAZ

Principio activo: Amitraz 12,5 %
Uso: Garrapaticida, piojicida y sarnicida.
Especies: Bovinos.
Dosis:
- Inmersión: pie de baño 1,6 L + 5 kg de polvo estabilizador cada 1.000 L · reposición 3,2 L + 10 kg cada 1.000 L.
- Aspersión: 1 L cada 500 L de agua.
- En planes de erradicación, bañar cada 21 días.

Vía de aplicación: Baño de inmersión o aspersión.
Tiempo de espera: Carne: 14 días · Leche: 24 horas.
Presentación: 200 mL · 1 L



INNOTRIN

Principio activo: Alfacipermetrina 5 %
Uso: Garrapatas, ácaros, moscas, tábanos, piojos y pulgas. También para instalaciones.
Especies: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos, aves, conejos, caninos y cuyes.
Dosis:
- Animales: 1 mL por litro de agua.
- Instalaciones: 2 mL por litro de agua (1 L de solución cada 4 m²).

Vía de aplicación: Baño de inmersión o aspersión.
Tiempo de espera: Carne y leche: 15 días.
Presentación: 20 mL · 1 L



ANTIPARASITARIOS INYECTABLES

PANDORA

Principio activo: Fosfato de levamisol 22,3 %
Uso: Nematodes gastrointestinales y pulmonares.
Especies: Bovinos, ovinos y porcinos.
Dosis:
- 1 mL cada 36,4 kg de peso vivo.

Vía de aplicación: Subcutánea o intramuscular.
Tiempo de espera: Carne: 7 días · Leche: 96 horas.
Presentación: 500 mL



4X2

Principio activo: Ivermectina 1 %
Uso: Endectocida: nematodes gastrointestinales y pulmonares, piojos, sarna y Dermatobia. Previene miasis.
Especies: Bovinos, ovinos y suinos.
Dosis:
- Bovinos y ovinos: 1 mL cada 50 kg de peso vivo.
- Suinos: 1 mL cada 33 kg de peso vivo.

Vía de aplicación: Subcutánea.
Tiempo de espera: Carne: bovinos 35 días, ovinos 21 días, suinos 28 días · Leche: no usar en lactación ni 28 días antes del parto.
Presentación: 500 mL · 1 L



SKIPPER

Principio activo: Ricobendazol 15 %
Uso: Nematodes gastrointestinales y pulmonares en formas adultas, inmaduras y huevos.
Especies: Bovinos.
Dosis:
- 1 mL cada 40 kg de peso vivo.
- Ostertagiasis inhibida: 1 mL cada 20 kg de peso vivo.

Vía de aplicación: Subcutánea, detrás de la paleta o en la tabla del cuello.
Tiempo de espera: Carne: 28 días · Leche: 3 días.
Presentación: 500 mL



CLICK

Principio activo: Doramectina 1 %
Uso: Antiparasitario de amplio espectro contra endo y ectoparásitos.
Especies: Bovinos, ovinos y cerdos.
Dosis:
- Bovinos y ovinos: 1 mL cada 50 kg de peso vivo (SC o IM).
- Cerdos: 1 mL cada 33 kg de peso vivo (IM).

Vía de aplicación: Subcutánea o intramuscular.
Tiempo de espera: Carne: bovinos 50 días, ovinos 35 días, cerdos 28 días · Leche: no usar en lactancia.
Presentación: 100 mL · 250 mL · 500 mL



4X4 FULL

Principio activo: Closantel 12,5 % + Ivermectina 1 % + Acetilmetionina 1 %
Uso: Endectocida y fasciolicida: nematodes, Fasciola hepatica adulta, piojos, sarna y Dermatobia.
Especies: Bovinos.
Dosis:
- 1 mL cada 50 kg de peso vivo.

Vía de aplicación: Subcutánea.
Tiempo de espera: Carne: 42 días · Leche: no usar en lactación.
Presentación: 500 mL



6X6

Principio activo: Ivermectina 0,5 % + Fosfato de levamisol 22,3 %
Uso: Endectocida de amplio espectro, ideal para terneros al destete y en su primer año. Controla Cooperia y Haemonchus resistentes a lactonas macrocíclicas.
Especies: Bovinos.
Dosis:
- 1 mL cada 25 kg de peso vivo.

Vía de aplicación: Subcutánea.
Tiempo de espera: Carne: 56 días · Leche: no usar en lactancia.
Presentación: 500 mL



BUMERANG 3,15 %

Principio activo: Ivermectina 3,15 % (formulación tixotrópica)

Uso: Antiparasitario interno y externo de acción prolongada: nematodes, sarna, piojos, Dermatobia y garrapata.

Especies: Bovinos.

Dosis:

- 1 mL cada 50 kg de peso vivo. Agitar 1 minuto; usar aguja 16.
- Erradicación de garrapata: tratar cada 45 días.

Vía de aplicación: Subcutánea, detrás de la paleta.

Tiempo de espera: Carne: 122 días · Leche: no usar en lactancia ni 122 días antes del parto.

Presentación: 500 mL



LOCK OUT 3,15 %

Principio activo: Ivermectina 3,15 % (formulación tixotrópica)

Uso: Antiparasitario interno y externo de acción prolongada: nematodes, sarna, piojos, Dermatobia y garrapata.

Especies: Bovinos.

Dosis:

- 1 mL cada 50 kg de peso vivo. Agitar 1 minuto; usar aguja 16.
- Erradicación de garrapata: aplicar cada 45 días.

Vía de aplicación: Subcutánea.

Tiempo de espera: Carne: 122 días · Leche: no usar en lactancia ni 122 días antes del parto.

Presentación: 500 mL



ANTIPARASITARIOS ORALES

VETALBEN ORO

Principio activo: Albendazol micronizado 10 % + Praziquantel 10 % + Sulfato de cobalto 0,65 %

Uso: Gusanos redondos gastrointestinales y pulmonares, tenias y Fasciola hepatica. El cobalto aporta acción antianémica.

Especies: Bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y camélidos.

Dosis:

- 1 mL cada 10 kg de peso vivo. Agitar vigorosamente antes de usar.

Vía de aplicación: Oral.

Tiempo de espera: Carne: 14 días · Leche: 3 días.

Presentación: 500 mL



FASINTEL PREMIUM BOVINOS

Principio activo: Triclabendazol 12 % + Fenbendazol 7,5 % + Sulfato de cobalto 0,65 %

Uso: Fasciolicida (formas adultas e inmaduras, incluso precoces) y antiparasitario contra gusanos gastrointestinales, pulmonares y tenias. Con acción antianémica.

Especies: Bovinos, ovinos y camélidos.

Dosis:

- 1 mL cada 10 kg de peso vivo. Agitar vigorosamente antes de usar.

Vía de aplicación: Oral.

Tiempo de espera: Carne: 28 días · Leche: no usar en animales en producción lechera.

Presentación: 500 mL



BONLAM

Principio activo: Ivermectina 0,1 % + Levamisol HCl 4 % + Praziquantel 1,88 %

Uso: Nematodes, tenias (Moniezia) y gusano de la nariz (Oestrus ovis). Ideal para corderos y borregos.

Especies: Ovinos y caprinos.

Dosis:

- 1 mL cada 5 kg de peso vivo.

Vía de aplicación: Oral.

Tiempo de espera: Carne: 28 días · Leche: no usar en lactancia.

Presentación: 1 L



RAIDER PLUS

Principio activo: Levamisol HCl 8 % + Ivermectina 0,2 % + Albendazol 5 %

Uso: Antiparasitario interno y externo: nematodes gastrointestinales y pulmonares y Oestrus ovis.

Especies: Ovinos y caprinos.

Dosis:

- 1 mL cada 10 kg de peso vivo. Agitar bien; no diluir.
- No repetir antes de los 28 días.

Vía de aplicación: Oral.

Tiempo de espera: Carne: 28 días · Leche: no usar en lactancia.

Presentación: 1 L



RANIZOLE

Principio activo: Ivermectina 0,2 % + Levamisol 8 % + Rafoxanide 7,5 %

Uso: Antihelmíntico y fasciolicida.

Especies: Ovinos y caprinos.

Dosis:

- 1 mL cada 10 kg de peso vivo.

Vía de aplicación: Oral.

Tiempo de espera: Carne: 42 días · Leche: no usar en lactancia.

Presentación: 1 L · 3 L



TRITOM NF

Principio activo: Naftalofos 15 %

Uso: Haemonchus, Trichostrongylus, Ostertagia, Nematodirus y Cooperia, en formas maduras e inmaduras.

Especies: Ovinos.

Dosis:

- Haemonchus: 1 mL cada 5 kg de peso vivo.
- Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus y Cooperia: 1 mL cada 3 kg de peso vivo.

Vía de aplicación: Oral.

Tiempo de espera: Carne: 14 días · Leche: no usar en lactancia.

Presentación: 1 L



CURABICHERAS / ANTIMIÁSICOS

FIPROTOP SPRAY

Principio activo: Fipronil 0,7 % + Sulfadiazina argéntica 0,1 % + Aluminio micronizado 5 %

Uso: Curabichera de triple acción: larvicida, antimicrobiana y cicatrizante. Efecto residual de al menos 7 días.

Especies: Bovinos, ovinos, suinos, equinos, caninos y felinos.

Dosis:

- Agitar y rociar abundantemente la herida a 10–15 cm de distancia.

Vía de aplicación: Tópica (aerosol).

Tiempo de espera: Carne: 200 días · Leche: no usar en lactancia.

Presentación: Aerosol de 600 mL



CURABICHERA POLVO 4X4

Principio activo: Diazinón 2,15 % + Ciromazina 0,05 %

Uso: Matabichera y repelente: ombligo de recién nacidos, castración, señalada, esquila y heridas accidentales.

Especies: Bovinos, ovinos, equinos, suinos y caninos.

Dosis:

- Aplicar sobre la herida. En general basta una sola aplicación.

Vía de aplicación: Tópica (polvo).

Tiempo de espera: Carne: 14 días · Leche: 24 horas.

Presentación: 200 g · 1 kg · 1,5 kg



TOP ACTION SPRAY

Principio activo: Fipronil 0,25 %

Uso: Antipulgas y antigarrapatas para perros; antipulgas para gatos.

Especies: Caninos y felinos.

Dosis:

- 3 a 6 mL por kg de peso vivo (la dosis mayor para pelo largo).
- Rociar a 15 cm, a contrapelo, cubriendo todo el animal.

Vía de aplicación: Spray.

Tiempo de espera: No requiere. No usar en cachorros de menos de 8 semanas ni en perros de menos de 2 kg.

Presentación: 100 mL



ANTI HEMATOZOARIOS

DIMIDOCARBO B12

Principio activo: Dipropionato de imidocarb 12 % + Vitamina B12
Uso: Prevención y tratamiento de la tristeza parasitaria: babesiosis y anaplasmosis bovina, babesiosis equina, babesiosis y erliquiosis canina.
Especies: Bovinos, equinos y caninos.
Dosis:

- Bovinos: babesiosis 1 mL cada 100 kg · anaplasmosis 2,5 mL cada 100 kg.
- Equinos: 2 mL cada 100 kg.
- Caninos: 0,25 a 0,5 mL cada 10 kg.

Vía de aplicación: Subcutánea (bovinos y caninos) o intramuscular (equinos).
Tiempo de espera: Carne: 90 días · Leche: no usar en lactancia.
Presentación: 20 mL · 50 mL · 100 mL · 250 mL



ANTIBIÓTICOS Y ANTIINFLAMATORIOS

TRIMETO

Principio activo: Trimetoprim 4 g + Sulfatiazol 4 g + Sulfamerazina 10 g + Sulfadiazina 6 g (cada 100 mL)

Uso: Antibiótico y antidiarreico.

Especies: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos y pequeños animales.

Dosis:

- Bovino adulto y cerdos: 7 mL cada 100 kg.
- Terneros: 4 mL cada 50 kg.
- Lechones al destete: 1 mL cada 15 kg · lechones: 0,5 a 1 mL por animal.

Vía de aplicación: Intramuscular.

Tiempo de espera: Carne: 28 días · Leche: 5 días.

Presentación: 100 mL



FLOXANOVA PLUS

Principio activo: Enrofloxacina 20 % + Diclofenaco sódico 2,5 %

Uso: Infecciones dérmicas, respiratorias, urinarias e intestinales. Además, antiinflamatorio, antipirético y analgésico.

Especies: Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos, porcinos y equinos.

Dosis:

- 1 mL cada 40 kg de peso vivo.
- Equinos: 0,5 mL cada 40 kg de peso vivo.

Vía de aplicación: Intramuscular o subcutánea.

Tiempo de espera: Carne: porcinos 13 días; bovinos, ovinos y caprinos 30 días · Leche: no usar en vacas en producción.

Presentación: 50 mL · 100 mL · 250 mL



GENTAMIN 10 % PLUS

Principio activo: Gentamicina sulfato 10 %

Uso: Antibiótico de amplio espectro: infecciones intestinales, respiratorias crónicas, urinarias y dérmicas.

Especies: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos, porcinos, caninos y felinos.

Dosis:

- Bovinos, ovinos y caprinos: 1 mL cada 50 kg, IM, cada 8 h.
- Equinos: 0,6 mL cada 10 kg, IV o SC, cada 24 h · potros: 0,6 mL cada 20 kg, IV, cada 12 h.
- Cerdos: 2 mL cada 50 kg · caninos y felinos: 0,1 mL cada 2 kg, cada 24 h.

Vía de aplicación: Intramuscular, intravenosa o subcutánea, según la especie.

Tiempo de espera: Carne (bovinos): 80 días · Leche: 3 días.

Presentación: 100 mL · 250 mL



DEXA

Principio activo: Dexametasona 0,2 % (2 mg/mL)

Uso: Antiinflamatorio esteroideo: shock, estrés, cetosis bovina, afecciones de la piel e inflamaciones osteomusculares en equinos.

Especies: Equinos, bovinos, suinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.

Dosis:

- Equinos y bovinos: 5 a 15 mL · terneros y potros: 1 a 2,5 mL.
- Ovinos, suinos y caprinos: 1 a 2,5 mL · caninos: 0,12 a 1 mL.
- Intraarticular (ganado mayor): 1 a 5 mL.

Vía de aplicación: Intramuscular, intravenosa o intraarticular.

Tiempo de espera: Carne: 6 días · Leche: 0 días.

Presentación: 50 mL



VETALFEN 10

Principio activo: Ketoprofeno 10 %

Uso: Antiinflamatorio no esteroideo, analgésico y antipirético: traumatismos, artritis, mastitis, cólicos y dolor posquirúrgico.

Especies: Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos, equinos, porcinos y caninos.

Dosis:

- Bovinos y porcinos: 3 mL cada 100 kg · equinos: 2,2 mL cada 100 kg.
- Ovinos, caprinos y camélidos: 1,5 mL cada 50 kg · caninos: 0,1 a 0,2 mL cada 10 kg.
- Cada 24 h, por no más de 5 a 7 días.

Vía de aplicación: Intramuscular o intravenosa (en caninos, también subcutánea).

Tiempo de espera: Carne: 4 días.

Presentación: 20 mL · 100 mL · 250 mL



TÓNICOS / MULTIVITAMÍNICOS / RECONSTITUYENTES

ROBOMAX

Principio activo: Fosforilcolina cálcica 5 % + Vitamina B12 + Digerido ácido de caseína 5 %

Uso: Tónico reconstituyente y energizante. Estimula el apetito y la formación de sangre. Útil en estrés, posparto, vaca caída, terneros débiles y convalecencia.

Especies: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y suinos.

Dosis:

- Bovino adulto: 10 a 25 mL (IV o SC) · equino adulto: 15 a 20 mL (SC).
- Terneros y potros: 5 a 15 mL · ovejas y cabras: 3 a 5 mL · corderos: 2 a 3 mL.
- Porcino adulto: 5 a 10 mL · lechones: 1 a 3 mL.

Vía de aplicación: Intravenosa, intramuscular o subcutánea (no usar IV en equinos).

Tiempo de espera: No requiere.

Presentación: 250 mL · 500 mL



ROCKET O-I

Principio activo: Fósforo orgánico e inorgánico + Selenio, Cobre, Potasio y Magnesio

Uso: Previene y corrige carencias de fósforo, selenio, cobre, potasio y magnesio. Previene raquitismo y osteomalacia y ayuda a recuperar la función reproductiva.

Especies: Bovinos, ovinos y suinos.

Dosis:

- Bovinos adultos: 10 mL por animal.
- Terneros, ovinos y cerdos: 5 mL por animal.

Vía de aplicación: Preferentemente intramuscular.

Tiempo de espera: Carne: 20 días · Leche: 72 horas.

Presentación: 500 mL



BIOANEMIN B12

Principio activo: Cacodilato de sodio + Hierro + Cobalto + Vitamina B12 + Aminoácidos

Uso: Antianémico, tónico y reconstituyente: anemias, debilidad, convalecencia, inapetencia y apoyo en anaplasmosis y piroplasmosis.

Especies: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos, porcinos, caninos, felinos y aves.

Dosis:

- Bovinos y equinos: 10 a 20 mL · terneros y potrillos: 5 a 10 mL.
- Ovinos y caprinos: 5 mL · corderos y cabritos: 2 a 3 mL · porcinos: 1 a 10 mL según peso.
- Caninos: 1 a 5 mL · felinos: 0,5 a 2 mL · aves: 0,2 mL/kg.

Vía de aplicación: Intramuscular profunda, subcutánea o endovenosa lenta.

Tiempo de espera: No posee.

Presentación: Ampollas de 10 mL · frascos de 50, 100, 250 y 500 mL



ENERGIMAX

Principio activo: Aspartatos de potasio y magnesio + Glicocola + Selenio + ATP + Vitamina B12

Uso: Reconstituyente muscular: fatiga en animales de competencia, miopatías, enfermedad del músculo blanco, vigor sexual de sementales y recuperación de lesiones.

Especies: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos, porcinos, caninos, felinos y aves.

Dosis:

- Bovinos y equinos: 10 mL · ovinos, caprinos y camélidos: 2 mL.
- Porcinos: 2 a 10 mL según peso, cada 24 h.
- Caninos: 0,2 a 1 mL · felinos y gallos de pelea: 0,2 a 0,5 mL.

Vía de aplicación: Intramuscular o endovenosa lenta.

Tiempo de espera: No posee.

Presentación: 20 mL · 50 mL · 100 mL · 250 mL · 500 mL



CORONADO

- PRODUCTOS VETERINARIOS -

(021) 502 708

(+595) 987 207 103

comercial@coronado.com.py

@distribuidora.coronado76

Coronado S.A.

www.coronado.com.py